

HOIATUS!



EUH401

H411
P273
P391
SP1

SPe3

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töөлahuse ning taara- ja sedmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega.

Silma sattumisel: Loputada silmi vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega (silmaalud avatud).

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pööruda arsti poole.

Allaneelamisel: Anda kannatanule aktiivsütt koos rohke veega. Pööruda arsti poole, võimalusel näidata etiketti.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pakendi purunemisel

Välja voolanud preparaati katta liiva või saepuruga kuni preparaati on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeriruga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja lisada loputusvesi valmistatavasse töөлahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Loa valdaja/tootja/pakendaja: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland.

Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Turustaja: Oilseeds Trade AS, Reg nr 11141531, Humala 2, 10617 Tallinn, Estonia

Tel. +372 657 7850, Fax +372 657 7851

E-mail: oilseeds@oilseeds.ee Website: www.oilseeds.ee

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2018

© Barbarian and Biograde are registered trademarks of Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Eesti reg.nr.:
0559/18.06.15

Toimeaine:
360 g/l glüfosaat

Preparaadi vorm:
vees lahustuv
konsentraat

Taimekaitsevahend:
Herbitsiid

Barbarian Super 360
võib osta ja kasutada
ainult
taimekaitsetunnistust
omav isik. Vältimaks
ohtu inimesele ja
keskkonnale tuleb
järgida kasutusjuhendi
nõudeid

Barbarian Super 360 on
mitteselektiivne herbitsiid
enamiku ühe- ja
mitmeaastaste seemne-
ja juururohtude
tõrjeks viljapuuaedades,
kõrrepõldudel, kesadel,
rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel
maadel, ristikul,
metsanduses.

Pakendid:
0,5l, 0,75l, 1l, 2l, 2,5l, 5l, 10l,
20l



TÖÖOHUTUS

Kasutaja kaitseks tuleb lisaks järgnevalt loetletud isikukaitsevahenditele võimalusel kasutada insenertehnilisi lahendusi.

Toote käitlemisel või tootega saastunud pindadega töötamisel KANDA SOBIVAID KAITSEKINDAID.

Käsipritside, rotaatorpühustite ja umbrohupintseldite kasutamisel KANDA SOBIVAT KAITSERIETUST (KOMBINESOONI), KAITSEKINDAID JA SILMADE/NÄO KAITSET.

PIHUST MITTE SISSE HINGATA!

Kontsentraadi sattumisel nahale või silma tuleb see viivitamatult MAHA PESTA.

PESTA KOGU KAITSERIETUS pärast kasutamist põhjalikult, eriti kinnaste siseküljed.

PESTA KÄED JA PALJASTATUD NAHAPINNAD enne söömist, joomist või suitsetamist ja pärast töö lõpetamist.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride öitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb öitsvat umbrohtu.

Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihhtmärktaimedele töödeldava ala ümber.

Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

| Mittepritsitav puhvervöönd meetrites | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Kulunorm | Triivi vähendavate otsikuteta | Triivi vähendavate otsikutega | | |
| | | 50% | 75% | 90% |
| 1 l/ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 l/ha | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 l/ha | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 l/ha | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 l/ha | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 l/ha | 5 | 5 | 0 | 0 |

KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: Kõik kasutusjuhendis toodud juhised tuleb hoolikalt läbi lugeda, et tagada toote efektiivne ja ohutu kasutamine.

| Kultuur | Maksimaalne ühekorndne kulunorm | Maksimaalne summaarne kulunorm | Hiliseim kasutusaeg |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Kõrrepõllud, kesad | 1-6 l/ha | 6 l/ha | 5-10 päeva enne järgneva kultuuri külvi või istutamist |
| Rohumaade likvideerimine, rohumaade uuendamine | 3-6 l/ha | 6 l/ha aastas | 5-10 päeva enne järgneva kultuuri külvi või istutamist |
| Ristik (Võrmi kollete pitsimine) | 6 l/ha | 6 l/ha aastas | - |
| Mittepõllumajanduslikud maad: teed, teepeenrad, kuivade kraavide perved, tööstuspiirkonnad, bensiinjaamad, lennuväljad, raudteed, kalmistud, avalikud kohad (välja arvatud mänguväljakud) | 1.5-2 l/ha | 2 l/ha aastas | - |
| Viljapuuaiad (Reavahed) | 2-4 l/ha | 4 l/ha aastas | Pritsida pärast sügisest lehtede langemist või kevadel kuni pungade paisumise lõpu faasini. |
| Mets | 2-4 l/ha | 4 l/ha aastas | - |

ÜLDINFORMATSIOON

Barbarian Super 360 on lehtede kaudu toimiv mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku, risoomidesse ja võsunditesse.

Preparaadi mõju on vaadeldav 5-10 päeva pärast pitsimist. Lehestiku punakaks muutumist ning seejärel kolletumist võib märgata esmalt kõrrelistel, hiljem ka laialehistel umbrohtudel. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul.

Täieliku efekti saavutamiseks peab pitsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis, piisava arvu lehtedega ega ole kahjustunud põua tõttu. Põuast, liigveest, öökülmast, väga kõrgetest temperatuuridest ja loomulikust pealsete suremisest tingitud kasvupeatuses kõrrelised ja laialehised umbrohud on

Barbarian Super 360 suhtes vähem tundlikud. Preparaadi efektiivsus langeb, kui ebasoodsad tingimused valitsevad kas pritsimise ajal või vahetult pärast seda.

Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3-6 rohelist ja elujulist lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. Orashein on Barbarian Super 360 suhtes eriti tundlik võrsumise ajal, mil uued risoomid on alustanud kasvu.

Üheaastased umbrohud peavad hea tõrjeefekti saavutamiseks olema aktiivse kasvu faasis, kõrrelistel vähemalt 5cm pikkune leht ja laialehistel umbrohtudel vähemalt 2 lahtirullunud pärislehte.

Üksikutel juhtudel võib esineda mõningat kasvupidurdust, seda eriti otsekülvi puhul, kus seemned idanevad kõdunevate lehtede, võsundite, risoomide ja juurte massis. Kõduneva orgaanilise materjali hajutamiseks või sügavamale matmiseks on vajalik põhjalik kultiveerimine või künd. Tagage, et muld oleks piisavalt kobestatud ja kultuur piisavalt väetatud. Kasutatada sobivaid meetmeid putukkahjurite ja seenhaiguste kahjustuste vältimiseks järgnevale kultuurile, eriti juhul kui likvideeritakse rohumaad.

ÄRGE kasutage lupja, väetist, sõnnikut, pestitsiide jms 7 päeva jooksul PÄRAST Barbarian Super 360 kasutamist.

Tähelepanu: Barbarian Super 360 ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.

MULLAD

Barbarian Super 360 võib kasutada umbrohtõrjeks kõikidel mineraalsetel ja orgaanilistel muldadel või pindadel sealhulgas ka tuhal ja kruusal. Hävivad ainult need umbrohud, millel pritsimise ajal on rohelisi lehti. Tootel Barbarian Super 360 ei ole pikaajalist järeltoimet/jääkmõju.

JÄRELKULTUURID

Barbarian Super 360 ei ole pärast kasutamist kauakestvat herbitsiidset mõju pinnasele. Põllumajanduslikele ja aianduslikele pindadele võib istutada puid mitte enne kui 7 päeva pärast pritsimist, juhul kui ei ole teisiti määratud. Teisi ilutaimi võib istutada pärast pritsitud taimiku hävimist või kultiveerimise järel. Normaalsete ilmastikutingimuste korral võib pinnast kultiveerida 7 päeva pärast pritsimist. Halbade kasvutingimuste korral tuleb enne kultiveerimist oodata punase/kollase lehevärvuse ilmnemiseni.

ILMASTIKUTINGIMUSED

Pritsimisele peaks järgnema vähemalt 6-tunnine, eelistatavalt 24-tunnine kuiv periood. Ärge pritsige liigse kuivuse all kannatavaid umbrohtusid, tulemus võib olla soovitud kesisem. Ärge pritsige, kui tuule kiirus on rohkem kui 4 m/s vältides sellega preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

tuulise ilma korral, kuna tuul võib kanda pritsimislahuse teistele põllukultuuridele või taimestikule ning põhjustada tõsiseid kahjustusi või hävinemist.

Ärge pritsige väga külma ilmaga, temperatuuridel alla 0°C, see võib pidurdada taimede aktiivset kasvamist ja esile kutsuda rohu vananemise.

MUUD PIIRANGUD

Rotaatorpihustite kasutamisel peab tekkiva pihuse osakeste minimaalne läbimõõt VMD (Volume Median Diameter) olema 200 mikronit.

Rohumaade pritsimisel ei tohi kariloomi vahendiga töödeldud aladel karjatada ning niidetud heina ei tohi kasutada loomasöödaks.

Umbrohupintseldeid (weed-wipers) võib kasutada kõigil kultuuridele mille puhul pintseldi ei puuduta kasvatatavat kultuuri. Maksimaalsed kontsentratsioonid ei tohi ületada järgnevat: (a) Weedwiper Mini – 1:2 lahjendamine veega; (b) Teised pintseldid – 1:1 lahjendamine veega.

KULUNORMID

Orasheina ja teiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tõrje.

Lubatud kasutada 1 kord hooajal.

SELGPRITSI TÖÖLAHUSE ARVUTUSTABEL

Standardseid õigesti kalibreeritud pihusteid kasutades saab iga töölahuse liitriga pritsida 40m² (250l/ha vett).

Selgpritsiga pritsitav toote doos peab olema vastavuses etiketi Kasutusjuhendi osas antud ametlike kulunormidega.

| Barbarian Super 360 kogus 250 liitri vee kohta, et pritsida 1ha | Barbarian Super 360 kogus 10 liitri vee kohta, et pritsida 400m² | Barbarian Super 360 kogus 1 liitri vee kohta |
|--|--|---|
| 2.0 l/ha | 80 ml | 8 ml |
| 4.0 l/ha | 160 ml | 16 ml |
| 6.0 l/ha | 240 ml | 24 ml |

KÖRREPÖLLUD JA KESAD – ÜHE- JA MITMEAASTASTE UMBROHTUDE NING SOOVIMATUTE KULTUURIDE HÄVITAMINE ENNE ÜBERKÜLVI.

Mitte kasutada klaasi ega kile all.

Kultuurid: kõrrepõllud ja kesad.

Tõrjutavad umbrohud: Juba tärganud ühe-, kahe- ja mitmeaastased umbrohud.
Vähend

| Ajastus | Kasutamine | Kulunorm |
|---|---|---|
| Pritsida ajal, mil mitmeaastased umbrohud on aktiivse kasvu faasis. Orasheinal peab olema vähemalt 6 lehte pikkusega umbes 12 cm. | Võimaldada umbrohupealsetel suureks kasvada ja pritsida enne külmade saabumist või loomulikku vananemist. Pärast pritsimist: <ul style="list-style-type: none">• Oodake enne kultiveerimist või muid põllutöid vähemalt 5 päeva või kuni mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude lehtede kollaseks või punakaks muutmiseni.• Taimejäänused tuleb peenestada ja sisse künda või eemaldada, pärast mida võib jätkata tavapärase maaharimisega. | Üheaastased umbrohud: 1 l/ha Üheaastased laialehised umbrohud: 4 l/ha Mitmeaastased kõrrelised ja laialehised umbrohud: 6 l/ha Vee kulunorm 100-400 l/ha. |

VÖRMI TÕRJE RISTIKUS

Tõrjutavad umbrohud: Võrm (*Cuscuta sp.*)

Kultuurid: Ristik

| Ajastus | Kasutamine | Kulunorm |
|---------|--|---|
| - | Pritsida võrmi kolletes kõiki taimi, et hävitada parasiit tema peremeestaime hävitamise kaudu. | 6 l/ha Vee kulunorm 150-250 l/ha. |

ROHUMAAD LIKVIDEERIMINE JA UUENDAMINE

Hävitatavad heintaimed/umbrohud:

Ühe- ja mitmeaastased kõrrelised ning ühe- ja mitmeaastased laialehised umbrohud.

Kultuurid: Pärast pitsimist võib külvata kõiki kultuure.

| Ajastus | Kasutamine | Kulunorm |
|---|--|--|
| <p>Pritsida, kui heintaimed ja umbrohud kasvavad aktiivselt järgmistel aegadel ja kasvufaasides: Enne järgneva kultuuri külvi või istutamist</p> <p>Üheaastased kõrrelised ja üheaastased laialehised umbrohud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kevad, suvi ja sügis. • Üheaastastel kõrrelistel on vähemalt 10cm rohelist lehte. • Üheaastastel laialehistel umbrohtudel on vähemalt kaks pärislehte. <p>Mitmeaastased kõrrelised ja mitmeaastased laialehised umbrohud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesk- kuni hilissuvel. • Mitmeaastastel kõrrelistel on vähemalt 12cm lehte või 5 täielikult avanenud lehte. • Mitmeaastastel laialehistel umbrohtudel on arvestatav lehepind või nad lähenevad õitsemisele. | <ul style="list-style-type: none"> • Enne kasutamist kergelt niita või karjatada ning võimaldada juurdekasvu umbes 4 nädalat kuni soovitud kasvufaaside saavutamiseni. • Vahendiga töödledud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasöödaks. • Pritsida umbrohu või kõrrelise tüübile soovitud kulunormidega. • Enne taimestiku eemaldamist niitmise ja enne külvamist või kultiveerimist ooteaeg vähemalt 5 päeva. • Vana rohumaad rohkem tuletakse enne ümberkülvi kultiveerimisega purustada <p>- vaata ka ÜLDINFORMATSIOON.</p> | <p>1-2-aastased rohumaad üheaastaste umbrohtude ja kõrrelistega: 3 l/ha</p> <p>2-4-aastased rohumaad mitmeaastaste kõrrelistega: 4 l/ha</p> <p>Pikaajalised rohumaad (4-7 aastat) mitmeaastaste laialehistel umbrohtudega: 5 l/ha</p> <p>Püsirohumaad valdavalt kitsalehiste kõrrelistega: 6 l/ha</p> <p>Vee kulunorm 100-250 l/ha.</p> |

VILJAPUUAEDADE REAVAHED

Tõrjutavad umbrohud: Juba tärganud ühe-, kahe- ja mitmeaastased umbrohud.

| Ajastus | Kasutamine | Kulunorm |
|---|---|---|
| Juba kasvavad viljapuud (vähemalt 2 aastat) | Kasutada vastavalt juhendile, kas keskmise või jämeda pritsena. Pritsida pärast sügisest lehtede langemist või kevadel kuni pungade paisumise lõpu faasini. Vältige tüvede pritsimist kõrgemal kui 30 cm maapinnast või pritse kandumist okstele ning tüvele. Pritselahus ei tohi sattuda kontakti koorevigastustega. | <p>Üheaastased umbrohud: 2 l/ha</p> <p>Üheaastased laialehised umbrohud: 4 l/ha</p> <p>Mitmeaastased kõrrelised ja laialehised umbrohud: 4 l/ha</p> <p>Vee kulunorm 100-400 l/ha.</p> |

METSANDUS/PUISTUD

| Ajastus | Kasutamine | Kulunorm |
|--|---|---|
| Enne istutamist: Enamik ühe- ja mitmeaastaseid umbrohtusid. | Kui pinnas on metsa majandamisest häiritud, võimaldage umbrohtudel uuesti kasvada. Pritsige, kui umbrohtudel ilmuvad rohelised lehed ning nad kasvavad aktiivselt. Enne kultiveerimist või puude istutamist ooteaeg vähemalt 7 päeva. | <p>Ühe- ja mitmeaastased umbrohud: 4 l/ha</p> <p><i>Hüdraulilised pritsid:</i> Vee kulunorm 100-250 l/ha. <i>Rotaatorpihustid:</i> Kasutada töölahust üldmahus 40 l/ha.</p> <p>Vee kulunorm 100-250 l/ha.</p> |
| Pärast istutamist (suunatud pihusena) metsakonkurentsi tingimustes: Puude ümbruse puhastamine; okaspuude vabastamine; | Kasutage spetsiaalset umbrohotõrjutat ("Weedwiper Mini") või selgpritsi täielikult kaitstud puude ümber. On KOHUSTUSLIK kasutada spetsiaalset PUUKAITSEKATET kõigi kasvuhooajal tehtavate | <p>Ühe- ja mitmeaastased umbrohud: 4 l/ha</p> <p>Selgpritsi kasutamisel kasutage tõrjutava umbrohuliigi jaoks sobivat allpool toodud kulunormi:</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>pritsimiste puhul. Pritsige sõnalgalgu pärast seda kui nende liitlehtede otsad on lahti keerdunud kuid enne taimede vananemist. Kanarbikku pritsida sügisel. Kõiki teisi puitunud umbrohtusid pritsida juunist augustini enne nende lehtede vananemist, ent pärast uue juurdekasvu kõvenemist/puitumist.</p> <p>Ouline: Suvise juurdekasvu puitumise aeg aastas varieerub liigiti, sõltudes muude tingimuste osas ka asukohast ja ilmastikutingimustest. Pritsimisel suunake pihus alati eemale suvisest juurdekasvust, vältimaks võrsetippude kahjustamist.</p> | <p>Enamik üheaastaseid kõrrelisi: 1 l/ha</p> <p>Enamik üheaastaseid laialehiseid umbrohtusid ja mitmeaastaseid umbrohtusid: 3 l/ha</p> <p>Laialehised puitunud umbrohud: sõnaljad, võsa, põldmurakas, vaher, tamm, sarapuu, paju, saar: 4 l/ha</p> <p>Vee kulunorm 100-250 l/ha.</p> |
| <p>Märkus: Pritsitud puude tuvastamise lihtsustamiseks võib ettevalmistatud töölahusele lisada kaubanduses vabalt kättesaadavat vees lahustuvat violetset värvainet vahekorras 1ml värvi 10 l töölahuse kohta.</p> | | |

MITTEPÖLLUMAJANDUSLIKUD MAAD

Tõrjutavad umbrohud: Enamik ühe- ja mitmeaastaseid umbrohtusid.

| Kasutusala | Kulunorm | Märkused |
|---|--|--|
| <p>Teed, teepeenrad, kuivade kraavide perved, tööstuspiirkonnad, bensiinjaamad, lennuväljad, raudteed, kalmistud, avalikud kohad (välja arvatud</p> | <p>Üldkasutus: 1.5 – 2.0 l/ha</p> <p>Mitmeaastaste laialehiste umbrohtude esinemisel: 2 l/ha</p> <p><i>Hüdraulilised pritsid: Vee kulunorm</i> 100-250 l/ha.</p> | <p>Toodet kasutada ettevaatlikult. Veenduda, et pritsitakse ainult ajal, mil umbrohud on aktiivse kasvu faasis ja et pritsimine piirdub ainult nähtavate umbrohutaimedega, sh.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses)</p> | <p><i>Selgpriidid:</i> Vee kulunorm 100-250 l/ha.</p> <p><i>Rotaatorpihustid:</i> Kasutada töölahust üldmahus 40 l/ha.</p> | <p>nendega, mis asuvad 30 cm ribas rinnatiste äärtel ja maanteekraavide pervedel - mitte üle priitsida äravoolumkraave. Umbrohtusid, mis tärkavad pärast priitsimist, ei tõrjuta. Kasutada KESKMISE või JÄMEDA pihusena taimiku lehtedele. Vältida kandumist teistele kultuuridele, murudele, ilutaimedele või teistele väärtuslikele liikidele. MITTE KASUTADA KLAASI VÕI KILE ALL. VAATA SELGPRITSI TÖÖLAHUSE ARVUTUSTABELIT. MITTE PRITSIDA HEKIALUSEID.</p> |
| <p>Märkus: Pritsimisel ei tohi kariloomi vahendiga töödeldud aladel karjatada ning niidetud heina ei tohi kasutada loomasöödaks.</p> | | |

Pritsimislahuse valmistamine

Enne pritsimislahuse valmistamist kontrolli pritsi puhtust. Prits peab olema puhas. Täida pritsipaak 2/3 osas veega. Lisa vajalik kogus preparaati ja alusta segamist. Seejärel lisa ülejäänud vesi ja sega põhjalikult enne kasutamist. Töölahus tuleb ära kasutada samal päeval.

ÄRGE SEGAGE, KASUTAGE VÕI SÄILITAGE TOODET BARBARIAN SUPER 360 GALVANISEERITUD VÕI PEHMEST TERASEST VOODERDAMATA KANISTRITES VÕI MAHUTITES. **TOODET TOHIB HOIDA AINULT ORIGINAAL PAKENDIS.** HOIDKE MAHUTEID HÄSTI VENTILEERITAVAS RUUMIS NING EEMAL TULEKOLLETDEST.

Pritsi puhastamine:

Pärast töö lõpetamist tühjendada prits.

Loputada paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega ning pesta puhta vee ja spetsiaalse pesuainega. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need eraldi pesuainetega. Loputada paaki veega 5 minutit ja lasta vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgida, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett.

PRITSIMINE

Konventsionaalsed hüdraulilised pritsid

Selgpritsid

Valmistatud töölahus tuleb kasutada KESKMISE või JÄMEDA pihusena (BCPC klassifikatsioon) pihustisurvega, mis ei ületa 2.5 bar. Barbarian Super 360 on süsteemne herbitsiid ja toimib juba väikestes kogustes. **Alati võtke tarvitusele kõik abinõud, et vältida pritse kõrvalekandumist. ÄRGE PRITSIGE tuulise ilmaga, väärtuslike liikide või ilutaimede läheduses, sest pritse kandumine teistele kultuuridele ja taimestikule võib põhjustada tõsiseid kahjustusi või hävingut.**

SOBIVUS/SEGATAVUS

Uusima informatsiooni saamiseks võimalike sobivate paagisegude kohta võtke ühendust: Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland.

Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie

Barbarian Super 360 ei tohi segada toodetega, mis sisaldavad karfentrasoon-etüüli.

RESISTENTSUSE VÄLTIMINE

Igasse umbrohupopulatsiooni võib kuuluda taimi, mis on looduslikult vastupanuvõimelisemad või reistentsemad teatud herbitsiididele, mis võib nende toodete kasutamisel põhjustada madalat tõrjeefektiivsust. Glüfosaat on oma toimemehhanismilt vastavalt herbitsiidide resistentsuse töökomitee HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klassifikatsioonile G rühma herbitsiid.

Vastavalt kohalikele vajadustele ning integreeritud umbrohutõrje meetoditele tuleb kasutada herbitsiidide resistentsuse tekke kontrolli ja aeglustamise strateegiat. Selle alla kuuluvad herbitsiidide korrektne kasutamine, erinevate toimemehhanismide ning sobivate agrotehnikate integreeritud rakendamine:

- Järgida etiketil antud soovitusi, tagada, et tõrje on tehtud õiges umbrohtude kasvufaasis, õigetes ilmastikutingimustes ning õigete kulunormidega.
- Eelistada erinevate umbrohtude kasvu ja arengut takistavate traditsiooniliste agrotehnikate kasutamist
- Minimeerida umbrohtude leviku riski. Erinevate põldude vahel liikudes veenduda, et seadmete küljes ei oleks mulda ega taimi. Puhasta seade ühelt põllult teisele liikudes
- Efektiivse umbrohutõrje tagamiseks järgige alati Head Taimekaitsetava:

- Pritsimiseadmed peavad olema läbinud iga 3 aasta järel korrapärase tehnilise kontrolli selleks volitatud isikute poolt;
- Doseerimine ning pritsimine peavad olema sooritatud täpselt - prits peab olema kalibreeritud ning pritselahuse kogus pritsitava ala kohta peab olema õige;
- Kasutada tuleb õigeid pihustiotsikuid, et tagada umbrohutaimiku maksimaalne kaetus pritse minimaalse kõrvalekaldumisega;
- Pritsida tuleb ainult sobilikes ilmastikutingimustes;
- Umbrohutõrje toimet tuleb pärast pritsimist jälgida, et veenduda pritsimise efektiivsuses ja võimalike tõrjeprobleemide puudumises;
- Tõrjet vältinud umbrohud tuleb enne nende seemnete valmimist eemaldada mehaaniliselt või keemiliselt teiste glüfosaadist erinevate efektiivsete herbitsiididega.

Täiendavat informatsiooni võib saada HRAC kodulehelt (<http://www.hracglobal.com/>) või edasimüüjalt.

SÄILITAMINE

Hoida kuivas ja jahedas kohas temperatuurivahemikus 0 - 30 ° C, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaati 3 aastat alates valmistamise kuupäevast. Hoida külmumise eest!

KASUTAJA RISK

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisyhendam ning soovitusel on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.