

BOSTAT

Kleepaine kõikidele mullasisestele herbitsiididele

Bostat fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile

Kasutamine ja kasutuskogused

Bostat-it on soovitatav kasutada kõikide tärkamiselsetel ja -aegsetel herbitsiididel. Lisades toodet pritsimislahusesse pidurdab ta pritsitava herbitsiidi leostumise ja liikumise kultuuri juuretsooni, hoides preparaadi pinnase ülemises kihis. See aitab omakorda vähendada teatud toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Herbitsiidi aktiivsus paraneb ja mõju pikeneb tänu preparaadi püsivusele õiges piirkonnas.

Kasutuskogused: 200 ml/ ha

Väga kergetel, eelkõige kõikidel liivastel pinnastel on soovitatav suurendada kasutuskogust 400 ml/ ha kohta.

Pritsimislahuse segamine:

Tähtis!: **BOSTAT** lisatakse pritsimislahusele alati viimasena. Enne kui **BOSTAT** pihustuslahusele lisatakse tuleb veenduda, et eelnevalt on kõik herbitsiidid täielikult lahusega segunenud ja paagis dispergeeritud. **BOSTAT** on segatav kõikide levinud taimekaitsevahenditega.

Tabelis on toodud toimeained, millele on vaja lisada **BOSTAT**-t toote efektiivsuse tõstmiseks ning herbitsiidi leostumise vältimiseks.

Toimeaine	Registris olev toode, millel on vastav toimeaine
Tepraloxüdim	
Metribusiin+ flufenatseet	
Metribusiin	Mistral 700 WDG
Aklonifeen	Fenix
Bentasoon	Basagran
Chloridazon	
Prosulfokarb	Boxer
Metasakloor	Sultan 500 SC, Butisan
Flufenatseet	Komplet
Mesotrioon	Python
Klomasoon	Brasan, Kalif Mega
Napropamid	Devrinol 45 SC
Etofumesaat	Ethosat 500
Terbuthylazin + S-Metolachlor	
Metamitron	Goltix 700 SC
Pendimetaaliin	Activus 330 EC, Stomp, Flight
Metosulaam + Flufenatseet	