

CLICK 750 SL

TAIMEKAITSEVAHEND KASVUREGULAATOR

Kasutusvaldkond: kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toimeaine: kloromekvaatkloriid 750 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

Registreerimisnumber: 888/11.10.24

Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt.

Pakend: 5 l, 10 l, 20 l

CLICK 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!

Loa valdaja: Sharda Cropchem España, SL

Edificio Atalayas ärikeskus, Carril Condomina nr. 3, 12. korrus, 30006 Murcia, Hispaania.

Telefon: +3 4868 127589 faks: +34 868 127588

Tootja/pakkija: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vive Parle (West), 400056 Mumbai, India



Hoiatus

H290 Võib söövitada metalle.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H411 MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. Hädaabi telefon 112.

Esmaabi

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Allaneelamisel: Suud kohe loputada ja juua seejärel rohkesti vett.

Mürgistusteabeskuse lühinumber 16662. Hädaabi telefon 112.

Hoiustamine

Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödest ja toiduainetest. Madalaim säilitustemperatuur 0°C. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

Toote kirjeldus

Toimemehhanism

CLICK 750 SL on süsteemse toimega kasvuregulaator teraviljadele. Töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, mis vähendab lamandumisriski. CLICK 750 SL tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetisfooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel annab kasvuregulaatori kasutamine harvem hea tulemuse.

Kulunormid (l/ha)

Talinisu, tritikale 1,0 - 1,5 l/ha

Suvinisu 0,3-1,0 l/ha (olenevalt sordist)

Rukis 1,5-2,0 l/ha

Kaer 1,0-1,5 l/ha

Oder 0,6 l/ha

Lubatud 1 pritsimine kasvuperioodi jooksul.

Vee hulk: 200 - 400 l/ha

Pritsimise aeg

Parim tulemus saadakse pritsides teraviljasid võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 20-29); rukist 2. Kõrresõlmest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 32-39). Enamike teraviljaherbitsiidide kasutusaeg on varasem. Sõltuvalt sordist ja ilmastikutingimustest võib kloromekvaatkloriid mõjuda erinevalt, eriti odrale. Varajane pritsimine ei lühenda kõrsi vaid tugevdab juuresüsteemi ja suurendab võrsete arvu.

Segatavus teiste preparaatidega

CLICK 750 SL võib segada järgmiste preparaatidega: MCPA 750, (MCPA, dikloroprop, mekoprop). CLICK 750 SL võib kasutada koos mitmesuguste väetistega nagu X-leheväetis, kaaliumnitraat, karbamiid, mangaan-, magneesium- ja kaaliumsulfaat. Paagisegude valmistamisel tuleb lähtuda erinevate preparaatide kasutusjuhendist. CLICK 750 SL ei tohi kasutada koos tsüanasiini sisaldavate preparaatidega.

Ettevalmistus

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus CLICK 750 SL ja lahust samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega. Pritsimislahus tuleb ära kasutada kohe pärast selle valmistamist!

Puhastamine

Enne pritsimisega valmistamist ja pärast CLICK 750 SL kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. Selleks võib kasutada tavalist soodat 2-4 kg lisatuna 100 l pesuveele.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Tähelepanu

Taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisinstruktsioonid ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.