

Galistop 200 on selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude, esmajoones roomava madara, tõrjeks talinisu, taliodras, talitritikales, talirukkis ja suvinisu, suvioidras, kaeras ning maisis.

Ohulaused

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
SP1	Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada pritsimiseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Ettevaatust



Eesti reg-nr:

691/30.01.18

Toimeaine:

fluoroksupüür 200 g/L

Formulatsioon:

emulsioonikontsentraat (EC)

Galistop 200 võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale järgige kasutusjuhendi nõudeid.

Ohutusnõuete, maksimaalse ühekordse kulunormi, kasutuskordade arvu, hiliseima kasutaja ja teiste piirangute teadasaamiseks lugege käesolevat kasutusjuhendit.

Partii nr: vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat

Pakend: vaata pakendil

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Tootja/pakkija: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15, Iirimaa.
Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Koduleht: www.barclay.ie

Loa valdaja: Barclay Chemicals (R&D) Ltd.
Kontaktandmed vt. Ülevalt

Galistop 200® Barclay Chemicals (R&D) Ltd registreeritud kaubamärk.
Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2018.

1/22xxx-fx

5L and 20L use no size fixaform, if 1L label is flat label then print size on label. Contract packing will require size and e-mark on the label.

Ⓒ Required for 5ml – 10L. 1L and 5L will have e mark printed on can at production.

Hoiatuslaused

- P210** Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
- P261** Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
- P280** Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille või kaitsemaski.
- P301+P310+P331** ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist.
- P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
- P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P333+P313** Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
- P337+P313** Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P362+P364** Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P391** Mahavoolanud toode kokku koguda.
- P403+P233** Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.
- P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele seadusandlusele kui ohtlik jäätme, andes üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON

Isikukaitse

Toote käitlemisel **kanda sobivat kaitseriietust (kombinesooni), kaitsekindaid ja silmade/näo kaitset.**

Tootega saastunud pindadega töötamisel **kanda sobivaid kaitsekindaid.**

Käsitsi pritsimisel **kanda sobivat kaitseriietust (kombinesooni) ja sobivaid kaitsekindaid.**

Kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Kontsentraadi sattumisel nahale või silma tuleb see viivitamatult **maha pesta.**

Pesta käed ja kemikaaliga kokku puutunud nahk kohe pärast töö lõpetamist ja enne söömist.

Vältida nahale sattumist.

Halva enesetunde korral pöörduda viivitamatult arsti poole (võimaluse korral näidata pakendit või etiketti).

Keskkonnaohtlikkus

Mahavalgunud preparaati koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.

Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada ning vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Rakendada äärmist ettevaatust vältimaks pritsimislahuse tuulega kõrvalekandumist ja sattumist mittekultuurtaimedele väljaspool pritsimiseks määratud ala.

Säilitamine ning tühjade pakendite hävitamine

Pakendi korduvkasutamine ükskõik millisel eesmärgil on keelatud.

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadast.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida ainult originaalpakendis, tihedalt suletuna ja ohutus lukustatud kohas.

Tühjaks saanud pakend loputa põhjalikult 3 korda, loputusvesi valada pritsipaaki ning tühi pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Soovi korral tuleb võimaldada professionaalsele kasutajale juurdepääs toote ohutuskaardile.

Kulunormid ja pritsimise ajastamine (1 pritsimiskord)

Kultuur	Kasvufaas (BBCH)	Kulunorm (l/ha)	Tundlikud ja väga tundlikud umbrohud (tõrjub 85-100%)
Taliteraviljad (talinisu, talioder, talirukis, talitritikale)	23-29	0,4	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), põld-lõosilm (<i>Myosotis arvensis</i>), konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)
	30-39	0,6	
	40-45	0,7	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)
Suviteraviljad (suvinisu, suvioder, kaer)	13-19	0,2	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), põld-lõosilm (<i>Myosotis arvensis</i>), konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)
	20-29	0,4	
	30-45	0,5	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)
Mais	13-16	0,25	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)

Galistop 200't tuleb kasutada koos märgajaga. Soovitatud kulunorm on 0,1% vee kogusest.

Ooteaeg

Teraviljad: 60 päeva

Mais: 90 päeva

KASUTAMISEKS AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKU HERBITSIIDINA**Teised spetsiifilised piirangud**

- Koduloomad tuleb hoida pritsitud aladelt eemal vähemalt 7 päeva jooksul pärast pritsimist.
- Pakendi korduvkasutamine ükskõik millisel otstarbel on keelatud.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE ETIKETTI. ANTUD TOODET TOHIB KASUTADA AINULT ETIKETIL ETENÄHTUL VIISIL. JÄRGIGE TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE HEAD TAVA.

KASUTUSJUHE**Toime**

Galistop 200 on süsteemne herbitsiid, mis siseneb umbrohutaimedesse lehtede kaudu. On oluline, et tõrjutavad umbrohutaimed oleksid enne pritsimist täielikult tärganud ning et saavutataks umbrohtude lehestiku hea katmine pritsimislahusega. Pärast pritsimist tärkavatele umbrohtudele tõrje mõju puudub.

Ilmastik ja kasvutingimused

Parimad tulemused saavutatakse aktiivselt kasvavate noorte umbrohtude tõrjel soojades niisketes ilmastikutingimustes. Enne pritsimist veenduge, et kultuurtaimed oleksid elujõulised ning ei oleks stressis öökülmade, kahjurite, haiguste, toitaine puuduse või põua tõttu. Ärge pritsige märgi, vettinud või põuastressis kultuure ning külmal ajal öödel või öökülma ohu korral. Optimaalsed tõrjetulemused Galistop 200 kasutamisel võib saavutada ainult juhul, kui umbrohud kasvavad aktiivselt heades mullastiku- ning ilmastikutingimustes ja kultuurtaimed on elujõulised ning konkurentsivõimelised. Kasvutingimused on eriti olulised roomava madara tõrjel ja juhul kui Galistop 200't kasutatakse teraviljades üksi, ilma teiste paagisegu komponentideta, mis annaksid täiendavat efekti roomava madara vastu.

Mullaharimistööd

Kultuure mitte rullida ega äestada seitsme päeva jooksul pärast Galistop 200 kasutamist.

Allakülviga kultuurid

Ärge kasutage Galistop 200't kultuurides, millel on ristiku või liblikõieliste allakülv. Galistop 200't võib kasutada kõrreliste allakülviga kultuurides juhul, kui need on piisavalt hästi kinnistunud ning võrumisfaasis.

Pritsimine

Pritsida kuiva lehestikku. Mitte pritsida vahetult enne vihma. Vältida pritsimislahuse tuulega kandumist naaberkultuuridele või -aladele. Vältida pritsimisel ülekatet. Mitte kasutada seemnepõldudel.

Pritsida keskmise piisaga pritsena 2-2,5 bar (30-35 psi) juures klassikalise hüdraulilise traktoripritsiga, kasutades veekogust 100-300 l/ha tagamaks tõrjutavate umbrohtude hea katmise pritsimislahusega. Kasutada suuremaid pritsimislahuse koguseid tihedate kultuuride pritsimisel või kui umbrohud on suured või puitunud.

Kevadiste pritsimiste soovitusel algavad maikuust.

Ristirohu (*Senecio L.*) esinemisel tuleb lähtuda „Heast taimekaitsetavast“. Pritsitud ristirohu taimed on loomadele isuäratavad ka kõrge mürgainesisalduse juures. Loomad tuleb pritsitud aladelt eemale hoida kuni ristirohi on täielikult taastunud või surnud umbrohutaimed ei ole enam visuaalselt märgatavad. Mitte lisada pritsitud ristirohutaimi heina ega silosse.

Segatavus

Juhul kui Galistop 200't segatakse teise tootega, tuleb teise toote kasutusjuhendit täpselt järgida samaaegselt Galistop 200 kasutusjuhendi järgimisega. Lisage Galistop 200 paaki esimesena, välja arvatud juhul kui segatakse märguvaid pulbreid, suspensioonikonsentraate või vees lahustuvaid graanuleid või juhul kui on teisiti ette nähtud. Paagisegu tuleb ära pritsida koheselt pärast segamist. **Tritikales kasutamisel mitte segada paagisegus ühegi teise herbitsiidiga.**

Galistop 200't võib paagisegus segada järgmiste toimeainetega:

Kloormekvaat ± koliinkloriid	Fenproprimorf
Klopüraliid	Tsüpermetriin
Diklorprop	Prokloraas
Karbendasiiim	Propikonasool
MCPA	Klorotaloniil
Fenpropidiin	Triadimenool

Põhu käitlemine

Galistop 200'ga pritsitud põhku ei tohi kasutada kasvuhoonetes või kompostamiseks. Veenduge, et pihustatud toode ei satuks kõrval kasvavatele tundlikele taimedele, eriti seemnekartulile.

Järgnevad kultuurid

Puuduvad piirangud järgmisel aastal kasvatavate põllumajanduskultuuride suhtes.

Ümberkülv

Kui Galistop 200'ga töödeldud kultuur mingil põhjusel hävis, võib maisi ja maitsetaimi külvata 5 nädalat pärast Galistop 200'ga pritsimist.

Pritsi hooldamine

Iga kord vahetult pärast taimekaitsevahendi Galistop 200 kasutamist peske pritsi hoolikalt puhta vee ja pritside pesemiseks ettenähtud puhastusvahendiga. Ebakorrektsel puhastamisel pritsi jäänud toimeaine fluorküüüri jäägid võivad järgneval kasutamisel kahjustada vastuvõtlikke kultuure.

Segamine

Valage nõutav kogus Galistop 200't pooleldi veega täidetud pritsipaaki, mille segisti on sisse lülitatud. Täitke paak veega ettenähtud koguseni. Jätke segamist pritsimise ajal kuni kogu paak on tühjaks pritsitud.