

KYLEO

Taimekaitsevahend Herbitsiid

Toimeaine: glüfosaat 240 g/l + 2,4-D 160 g/l

Vesilahus

Ühe- ja kaheaastaste ning mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks puuviljaaedades, kõrrepõldudel, külvieelselt teravilja ja maisi põldudel ja mittepõllumajanduslikel maadel (elektriliinid, naftatorustik, gaasitorustik, maanteeäärsed teed, pargid, spordiväljakud, raudtee).

Toode sisaldab ohtlikke aineid glüfosaat isopropüülamiinsool ja 2,4-D DMA derivaat.

Kyleo'd võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Veekogude kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist 5 m pinnaveekogu veepiirist.



HOIATUS!

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208 Sisaldab 2,4-D. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.

P264 Pärast käitlemist pesta käed hoolikalt.

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

P302+352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

P305+351+338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/ konteiner kõrvaldada asjakohases jäätmekäitluskohas.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m pinnaveekogudest.

HÄDAABI TELEFON 112.

Pakend: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 220 l, 640 l, 1000 l.

Registreerimise nr: 0471/15.06.12

Partii nr.: vt. pakendilt

Valmistamise kuupäev: vt. pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast

Tootja/pakendaja ja loa haldaja:

Nufarm GmbH&Co KG,
St.-Peter-Strasse 25,
A-4021 Linz, Austria

Importijad ja edasimüüjad:

AS Baltic Agro	Scandagra Eesti AS
Peterburi tee 44,	Tartu mnt 56, Ulenurme,
Tallinn, EE - 11415	Tartumaa, EE - 61714
Tel.: 606 2286	Tel.: 736 7087

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND**KASUTAMINE**

KYLEO on süsteemne herbitsiid. Preparaadi toimeained on glüfosaat 240 g/l + 2,4D 160 g/l. Toimeained absorbeeruvad taimedesse lehtede ja teiste roheliste taimeosade kaudu aktiivse vegetatsiooni ajal. KYLEO mõju üheaastastele umbrohtudele on märgatav 2-4 päeva möödudes, mitmeaastastel umbrohtudel 7 päeva möödudes. 2-3 nädala möödudes on umbrohi täielikult hävinud. KYLEO mõjub efektiivseimalt umbrohule, millel on tugevad lehed (orasheinad vähemalt 3-4 lehte). Pritsima peab mitte vähem kui 3 tundi enne vihma. KYLEO toime on efektiivseim kui õhutemperatuur on +8 - +25°C ja on piisavalt niiske.

Kultuur	Kulu-norm, l/ha	Pritsimise aeg	Ooteaeg päevades
Viljapuudealune maa	3 - 5	Üheaastased kaheidulehelised umbrohud, juunis-juulis või sügisel pärast koristust. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadiga	Seemneviljalised - 30 luuviljalised - 15
Viljapuudealune maa	4 - 5	Kahe- ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud, juunis-juulis või sügisel pärast koristust. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadiga	Seemneviljalised - 30 luuviljalised - 15
Viljapuudealune maa	4 - 5	Üheidulehelised lühiealised umbrohud, kevadel. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadiga	Seemneviljalised - 30 luuviljalised - 15
Viljapuudealune maa	5	Üheidulehelised mitmeaastased umbrohud, suvel. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadiga	Seemneviljalised - 30 luuviljalised - 15
Teravilja kõrrepõllud	2 - 3	Üheaastased kaheidulehelised umbrohud pärast teravilja koristust	-
Teravilja kõrrepõllud	3 - 5	Kahe- ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud pärast teravilja koristust	-
Teravilja kõrrepõllud	3	Üheidulehelised lühiealised umbrohud pärast teravilja koristust	-
Teravilja kõrrepõllud	5	Üheidulehelised mitmeaastased umbrohud pärast teravilja koristust	-
Puude vahel on üheaastased kultuurid	3	Lühiealised üheidulehelised umbrohud pärast koristust	-
Puude vahel on üheaastased	5	Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud pärast koristust	-

kultuurid			
Enne teravilja, maisi külvi	2-3	Üheaastased kaheidulehelised umbrohud 1 päev enne teravilja ja 1-3 päeva enne maisi külvi	-
Enne teravilja, maisi külvi	3-5	Kahe- ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud 1 päev enne teravilja ja 1-3 päeva enne maisi külvi	-
Enne teravilja, maisi külvi	3	Lühiealised üheidulehelised umbrohud 1 päev enne teravilja ja 1-3 päeva enne maisi külvi	-
Enne teravilja, maisi külvi	5	Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud 1 päev enne teravilja ja 1-3 päeva enne maisi külvi	-
Mittepõllu- majanduslik maa (elektriliinid, naftatorustik, gaasitorustik, maanteeäärsed teed, pargid, spordiväljakud, raudtee)	4-5	Kaheidulehelised ja lühiealised üheidulehelised umbrohud kevadel/suvel	-
Mittepõllumajandus maad (elektriliinid, naftatorustik, gaasitorustik, maanteeäärsed teed, pargid, spordiväljakud, raudtee)	5	Mitmeaastased üheidulehelisele umbrohud kevadel/suvel	-
Käsipritsi kasutamisel*	5	Kahe- ja üheidulehelised umbrohud kevadel/suvel	-

*vältida pritsimislahuse sattumist lähedalolevatele kultuuridel

VEE KOGUS:

Viljapuudealune maa – 300 l/ha

Kõrrepõllud, mais ja nisu külvielselt – 100-400 l/ha

Mittepõllumajanduslikud maad, pargid, spordiväljakud, raudtee – 100 – 500 l/ha

Käsiprits – 250 l/ha

Lubatud pritsimiskordade arv hooaja jooksul: 1 kord

MÕJU KASVAVATELE TAIMEDELE

Aeg, mille möödudes võib Kyleo'ga töödeldud põldudele külvata taimi:

Taimed	Aeg, mille möödudes saab külvata taimi, päevades
Lutsern	30
Tatar	
Põldoad	
Lina	
Herned	
Kartulid	60
Suhkrupeet	
Päevalill	

Sinep (segakultuuris), raps (segakultuuris, põhikultuurina), juurviljad	Enne külvi Kyleo'd mitte kasutada*
---	------------------------------------

* võib külvata kevadel, kui Kyleo'd kasutati eelmise aasta sügisel.

PRITSIMISTEHNOLOOGIA

Enne pritsimist kontrollida pritsimisseadme korrasolekut, vahetada välja kulunud või katkised osad. Prits peab olema tehniliselt korras ja puhas. Lahuse valmistamisel kasutada puhast vett. Keelatud pritsida tuulise ilmaga (üle 4 m/s).

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Täita pritsipaak poole vajaliku veekogusega ja käivitada segisti. Lisada vajalik kogus preparaati. Lisada ülejäänud veekogus. Kasutada koheselt. Pritsimise ajal segada.

KAITSEVAHENDID

Töötamisel tuleb kanda sobivad isikukaitsevahendeid: 4. tüüpi kaitseriietust, mis kaitseb vedelate kemikaalide eest (vastavad standardile EN 14605 ja EN 340); keemiliste ainete kasutamiseks ettenähtud kindaid (vastavad standardile EN 374), nt. kindaid lateksist, neopreenist, nitrilist, polüvinüülkloriidist, butüülist, näokaitset (vastab standardile EN 166); tugevaid jalanõusid. Hingamisteede kaitsevahendid ei ole tavaliselt vajalikud, kuid vajadusel võib kasutada vahetatavate filtritega poolmaske A-P2.

SÄILITAMINE

Ladustatakse hermeetiliselt suletud originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, pestitsiidide hoidmiseks ette nähtud ruumides.

Hoida laste eest. Hoida eraldi toiduainetest, jookidest ja söödast.

Säilitada temperatuuril vahemikus 0°C kuni +35°.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

ESMAABI

Allaneelamisel pöörduda arsti poole. Juua ära klaas vett. Mitte kutsuda esile oksendamist.

Silma sattumisel pesta koheselt ja korralikult 15 – 20 minutit jooksva veega. Silmalaud peavad olema avatud. Võtta välja kontaktläätсед. Pöörduda arsti poole

Nahale sattumisel pesta kahjustatud piirkondi koheselt rohke veega 15-20 minutit. Võtta ära määrdunud riided, pesta riided puhtaks. Pöörduda arsti poole.

Hädaabi telefon 112

TÜHJADE PAKENDITE KÄITLEMINE

Valada vahend pritsipaaki. Toote jäägid ei tohi ära kuivada. Pakendite pesemiseks kasutada integreeritud loputamise või kolmekordse loputamise meetodit (loputada pakendit 3 korda puhta veega ja loputusvesi valada pritsimislahusesse). Pritsi pakendite loputamisseade loputab pakendeid 3-5 baarise survega. Pärast loputamist valada loputusvesi pritsipaaki.

Tühjad loputatud pakendid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud.

KESKKONNAOHUTUS

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

JURIIDILINE VASTUTUS

Preparaadi kasutamise soovitusel põhinevad teostatud katsetustel. Tootja ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad preparaadi vale hoiustamise ja kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud, kui preparaat on saadud ja hoiustatakse originaalses ja suletud pakendis, järgides preparaadi hoiustamistingimusi.