

# PROFI

## PROFI BOOR 150

EÜ väetis

**Vedel boorväetis**

150 grammi boori liitris. Vees lahustuv boor (B) monoetanoolamiin.  
10,9% (massiprotsent). Lubatud kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks.  
Sisaldab 3,5% (50g / l) lämmastiku (N).

13,6 kg netokaal

**10 L**

# PROFI

## Kasutusjuhised:

- Täitke pritsipaak 2/3 osas veega
- Alustage segamist
- Lisage vajaminev kogus väetist
- Lisage ülejäänud veekogus
- Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus
- Mitte ületada soovitatud koguseid

Sobivaim pritsimisaeg on õhtuti või pilves, sademeteta ilma korral.

## Hoiustamine:

- Hoiustamise temperatuur: -10 °C – +30 °C
- Kaitske pakendit vigastuste eest

## Aegumiskuupäev

24 kuud pärast tootmiskuupäeva, eeldusel et toodet hoitakse vastavalt hoiustamisjuhistele.

## Ettevaatusabinõud:

**Allaneelamisel:** Loputage suu, andke 2-3 klaasi vett juua Vajadusel konsulteerige arstiga. Kutsuge esile oksendamise. Mitte anda juua teadvuseta inimesele.

**Silma sattumisel:** Loputada rohke külma veega. Vajadusel eemaldada nägemisläätsed. Loputada veel kord. Pöörduge arsti poole.

**Nahale sattumisel:** Loputada rohke veega. Eemaldada saastunud riided. Kui sümptomid ei kao, pöördu arsti poole.

**Sissehingamisel:** Viia värske õhu kätte. Vajadusel pöördu arsti poole.

Vältida peene udu teket.

Kultuur	Kasutamisaeg	Kulunorm (L/ha)	Veekogus (L/ha)
Raps	Sügisel: 5-6 lehe faas	1,0 – 2,0	200 – 300
	Kevadel: Vegetatsiooniperioodi alguses Õienuppude faasis	1,0 – 3,0 1,0 – 3,0	200 – 300 200 – 300
Mais	6 - 9 lehe faasis Korrata 14 päeva möödudes	1,0	200 – 300
Kartul	Enne õitsemist	1,0 – 2,0	200 – 300
Suhkrupeet peedid	4 - 6 lehe faasis	3,0	200 – 300
	Rosetti kasvamisel	2,0 – 4,0	200 – 300
Maasikad	Õienuppude faasis Korrata 14 päeva möödudes	1,0	200 – 300
	Sügisel (istutusjärgselt)	2,0	200 – 300
Köögiviljad	Lehestiku väljaarenemisel	3,0	200 – 300

## PROFI BOOR 150

Sisaldab 11% vees lahustuvat (150 grammi/liitris) boori (B)

10 l