

Si



EÜ VÄETIS

Lebosol®-Silizium

Vedel kompleks-mikrotoitainete lahus, mis sisaldab rauda (Fe) ja tsinki (Zn)

0,5 % vees lahustuvat rauda ammonium soolana (7 g/l Fe)

1,5 % vees lahustuvat tsinki EDTA kelaadituna (20 g/l Zn)

sisaldades ka:

1,5% lämmastikku (20 g/l N); 45,3 räni (610 g/l SiO₃)

Maaletooja:

Scandagra Eesti AS

Tähe 13, 71012 Viljandi

www.scandagra.ee

Tootja:

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28

67471 Elmstein/Germany

Tel.: +49 6328 984 94-0

1,35 kg neto

1 l

UF1 PTK0-00X1-H002-QQKR

Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid.

15349

Lebosol®-Silizium

Kultuur	Eesmärk / probleem	Soovitus	Aeg
Toiteainete puuduses olevad taimed on vastuvõtlikumad haigustele ja mõjutatud abiootilisest stressist. Leheväetistega antavate makro- ja mikroväetistega saab kindlustada taimedele optimaalse väetusfooni.			
Kõik kultuurid	Suurendab taimede stressitaluvust, tõstab saagipotentsiaali ja parandab veekasutust vähendades kuumastressi. Juurestiku aktiveerimise tulemusel suureneb toitainete omastatavus. Tänu taimerakkude tugevnemisele suureneb taime vastupanuvõime kahjuritele ja haigustele.	1 - 6 korda, 0,5 - 2 l/ha (arvestuslik kontsentratsioon selgpritsile 0,2 - 0,3 %).	Vastavalt vajadusele
Teraviljad	Lämmastiku (N) omastatavus, elujõud ja seisukindlus	2 - 3 korda, 0,5 - 1 l/ha	Alates 3 - 4 lehe faasist
Kultuurrohumaad	Suurendab taimede stressitaluvust	2 - 5 korda, 0,5 l/ha	Vegetatsiooni perioodi jooksul
Kartul	Lämmastiku (N) omastatavus, elujõud ja mugulate koorekvaliteet	2 - 5 korda, 0,5 - 1 l/ha	Alates 6 lehe moodustumisest
Mais	Lämmastiku (N) omastatavus, elujõud ja varre seisukindlus	1 - 2 korda, 0,5 l/ha	Alates 4 lehe faasist
Aedmaasikas, aedvaarikas	Viljade kvaliteedi ja seisukindluse parandamiseks. Tõuseb transpordikindlus.	2 - 4 korda, 0,5 - 1 l/ha	Alates õiepungade nähtavale ilmumisest
Viljapuud	Viljade kvaliteedi ja seisukindluse parandamiseks. Tõuseb transpordikindlus.	2 - 5 korda, 0,5 - 1 l/ha	Alates õiepungade värvumisest

Täiendavaid soovitusi ja nõuandeid leiate kodulehelt: www.lebosol.de/en

Kasutamine vastavalt heale põllumajandustavale. Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Lehekaudsel väetamisel kasutage lehtede katmiseks sobivat veekogust, hoiduge kõrgest kontsentratsioonist. Kasutage vähemalt 2 tundi enne kastmist või vihmutamist. Puhastage seadmed pärast kasutamist. Avamata kanistri parim enne kuupäev: vt. kanistri ülaosas.

Segatavus: Meie toodet võib segada levinud taimekaitsevahenditega. Kuna kõiki praktiliselt esinevaid toimeid ei ole võimalik ette näha, siis on igal juhul otstarbekas proovida väikeses koguses pritsimiseks ettenähtud toodete segu. Leheväetiste või taimekaitsevahendite segude korral täitke prits 2/3 osas veega ja lisage toodet ükshaaval. Lisage toodet veega lahjendatult viimase komponendina. Pidevalt segades kohe peale valada.

Ladustamine: Meie toodet on testitud temperatuuril -10 °C kuni +45 °C ja seda on nendel temperatuuridel lihtne säilitada. Külma tekkinud kristalle võib uuesti soojas keskkonnas lahustada. Soovitage jäätumisvaba ladustamist temperatuuril +5 °C, et saavutada meie toote optimaalne toime.

ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA!

