

SCANDAGRA EESTIAS

TOIDUTERAVILJA KVALITEEDITINGIMUSED, 2022 saak

TOIDUNISU baasnäitajad:

Kvaliteedi näitaja	I kat	II kat	III kat	IV kat	V kat
Proteiin %, min	14	13	12	11	10
Niiskus %	11....14				
Mahukaal kg/hl. min	77	76	75	74	73
Langemisarv, sek.min	275	250	240	210	180
Kleepvalk % min	28	26	24	22	20
Teralisand s.h peentera %*	Max 5.0 (s.h peentera ** max 3.0, sh teised teraviljad 1,5%)				
Toksilisus	Pole lubatud				
Kahjulikud lisandid %	Max 0.05				
Sh fusarioossed terad	Max 0,1				
Katkised terad	Max 3%				
Tuulekaer ***	Max 20 tk/kg				

- Ostja jätab endale õiguse muuta ja lisada täiendavaid kvaliteedikategooriaid
- Nisu hinna fikseerimisel fikseeritakse söödanisu ja kõik pakutavad toidunisu kategooriad
- Hinnakorrektsiooni info vastavalt kvaliteedile on leitav kvaliteedi tingimustes

TOIDURUKIS

Kvaliteedi näitaja	II kat	I kat
Niiskus %	11...14	11...14
Mahukaal kg/hl, min	72	72
Langemisarv, sek..min	120	150
Teralisand s.h peentera % *	Max 4,0 (s.h peentera ** max 3,0sh teised teraviljad 1,5%)	
Toksilisus	Pole lubatud	
Tungaltera % ***	Max 0,05	
Tuulekaer tk/kg ****	Max 20	

TOIDUKAER

Kaer peab olema ühtlaselt ilus hele särav kollane, ilma kõrvaliste lõhnadeta, korraliku teraga, peavad olema toidukaera sordid.

Kvaliteedi näitaja/ ühik	Väärtus
1.Niiskus %	11...14
2.Mahukaal kg/hl, min	52
3. Muud teraviljad % max *	1,5
4. Tumenenud terad peale koorimist % max ***	0,5
5. Peentera % max **	10
6. Ilma kestata terad % max	5,0
7. Tuulekaer tk/kg ****	20

- Elus kahjurid ei ole lubatud.

- Fusarioossete tunnustega terade osakaal maksimaalselt kuni 0,1%
 - * Teralisand: peentera; muud teraviljad; kahjurite kahjustatud terad, terad, mille idu värvus on muutunud, plekilised terad; kuivatamisel ülekuumutatud terad.
 - ** peentera: **nisu** läbimine 2,0 x 20mm sõelast, **rukki** läbimine 1,8 x 20mm sõelast, **kaera** läbimine 2,0 x 20mm sõelast
 - *** prügilisand on lubatud max 2%. Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele. Prügilisand on võõrseemned (sh tuulekaer),
 - riknenud terad (sh tumenenud terad), võõrkehad, seemnekestad, tungaltera, nõgihaugusega terad, loomse päritoluga lisandid (suled, karvad, väljahaited, surnud putukad ja putukate osad).
- Kui toiduvilja kvaliteedi näitajatega teraviljas on tuulekaera sisaldus lubatust suurem, siis võetakse vili vastu söödateraviljana, kui see vastab söödateravilja kvaliteedi näitajatele.
- Mükotoksiinide sealhulgas Deoxynivalenol(DON), Zearalenoon(ZEN), Ochratoxin A, Alfatoxin B1 sisaldus ei tohi ületada EU normidega määratud piirväärtusi.

Mükotoksiinide maksimaalsed lubatud piirnormid toiduviljas , µg/kg (EÜ 1881/2006)			
Mükotoksiinid	DON	ZEА	OTA
Toidunisu ja toidurukis	1250	100	5
Toidukaer	1750	100	5

- Toiduvili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest.
- Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
- Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist **KORRALIKULT PUHASTATUD**. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
- Toiduvilja kategooriate ja kvaliteedi miinimum näitajad võivad hooajal muutuda.
- Kuivatamata vilja korral toimitakse vastavalt järgnevale:
<https://scandagra.ee/viljainfo/vastuvott/vilja-kuivatamine/>