



# UBP-110™

## Paagisegu valmistamise juhend

### Eelnevalt lahustatud UBP-110 kasutamine (eelistatud)

- 1** Valmistage UBP-110 emalahus enne toote lisamist taimekaitsepritsi. Sobiva lahuse saamiseks lahustage 1 kg UBP-110 10 L vees (emalahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 15%). Lahuse tegemiseks kasutada ainult puhast ja kloorimata vett. Toote lahustumise kiirendamiseks on soovitatav kasutada vett temperatuuriga 20-30 °C.
- 2** Veenduge, et taimekaitseprits oleks puhas ja ilma eelnevalt kasutatud toodete jääkideta. Täitke pritsi paak 1/2-2/3 osas veega, pange segaja tööle ja lisage eelnevalt lahustatud UBP-110 pritsi paaki. Seejärel lisage pidevalt segades ülejäänud vesi. UBP-110 tuleb paagisegusse lisada alati esimese tootena.
- 3** Vajadusel lisage pritsi paaki ülejäänud taimekaitsevahendid, järgides toodete etiketil olevaid soovitusi.
- 4** Tagamaks UBP-110 efektiivsust ja täielikku imendumist läbi lehtede, kasutage toodet kuivadel taimedel, tuulevaikse ilmaga ning kui temperatuur ei ole kõrgem kui 26 °C. Ärge kasutage UBP-110 kui 3 tunni jooksul pärast pritsimist on oodata sademeid.

### Eelnevalt lahustamata UBP-110 kasutamine

- 1** Veenduge, et taimekaitseprits oleks puhas ja ilma eelnevalt kasutatud toodete jääkideta. Tööahuse valmistamiseks kasutada puhast ja kloorimata vett. Toote lahustumise kiirendamiseks on soovitatav kasutada vett temperatuuriga 20-30 °C. Täitge pritsi paak 1/2-2/3 osas veega, pange segaja tööle ja lisage UBP-110 pritsi paaki. Seejärel lisage pidevalt segades ülejäänud vesi. UBP-110 tuleb paagisegusse alati lisada esimese tootena.
- 2** Vajadusel lisage pritsi paaki ülejäänud taimekaitsevahendid, järgides toodete etiketil olevaid soovitusi.
- 3** Tagamaks UBP-110 efektiivsust ja täielikku imendumist läbi lehtede, kasutage toodet kuivadel taimedel, tuulevaikse ilmaga ning kui temperatuur ei ole kõrgem kui 26 °C. Ärge kasutage UBP-110 kui 3 tunni jooksul pärast pritsimist on oodata sademeid.

Tutvuge etiketil olevate kasutussoovitustega tagamaks toote ohutu ja nõuetekohane käitlemine. Kui on kahtlus toote sobivuses teiste toodetega soovitame teha eelnevalt testsegu paagisegusse valitud toodetega. Paagisegu valmistamise juhiste mittejärgimine võib põhjustada sette tekkimist ja pihustite ummistumist. Kasutusjuhendi mittejärgmine võib lisaks eelnevalt nimetatud probleemidele põhjustada ka toote vähest efektiivsust.

