

VITALoSol® GOLD SC

EÜ-VÄETIS

Vedel mikrotoitainelahus vase (Cu) ja mangaaniga (Mn)

2,4% vase kogusisaldus (40 g/l Cu)

9,6% mangaani kogusisaldus (150 g/l Mn)

lisaks on koostises veel: 36% elementaarvävliit (570 g/l S)

Kogus:

10 l

15,8 kg netto

Tootja:
Lebosol® Dünger GmbH
Wiesengasse 28 · D-67471 Elmstein
Tel. +49 (0) 63 28-9 84 94-0
www.lebosol.de · info@lebosol.de



VITALoSol® GOLD SC

Kultuur

Eesmärk

Soovitus

Kõigis kultuurides	Toitainearustuseks mangaani, vase ja väävliga	1,5–3 l/ha lehtede kaudu väetamiseks vähemalt 200 l vees
	Suurendab taimede stressitaluvust ja haigustele vastupidavust	4–6 l/ha lehtede kaudu väetamiseks vähemalt 200 l vees
Teravili	Toiteainearustus ja elujõulisus	
	Talvekindlus, öökülmadele vastupidavuse suurendamine ja talvel hävimise vähendamine	1,5–3 l/ha sügisel kolmanda lehe staadiumis
	vastupidavus, saagikus, mikrotoitainete ja väävliga varustamine	1,5–3 l/ha kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest kuni esimese sõlme staadiumini
	saagikus, valgusisaldus ja kvaliteet	1,5–3 l/ha võrsumisfaasis
	Taimetervishoid ja stressitaluvus	
	Stressitaluvuse ja haigustele vastupidavuse suurendamine	4–6 l/ha sügisel kolmanda lehe staadiumis
	Stressitaluvuse ja haigustele vastupidavuse suurendamine	4–6 l/ha kevadel vegetatsiooniperioodi alguses
Kartul	Toiteainearustus ja elujõulisus	
	Varustamine toitainetega, sisemine ja koore kvaliteet	1,5–3 l/ha alates külvirea kokkukasvamisest
	Taimetervishoid ja stressitaluvus	
	Stressitaluvuse ja haigustele vastupidavuse suurendamine	4–6 l/ha alates külvirea kokkukasvamisest

Kasutamine hea kasutustava põhimõtte järgi.
Võtke niisutamiseks piisav kogus vett, vältige tilkumist.
Kasutage üksnes vajaduse korral.
Ärge ületage soovituslikku kasutuskogust.
Toimeaeg: vähemalt 2 tundi enne vihma või sademeid.
Puhastage seadmed pärast kasutust.



Segamine:

VITALoSol® GOLD saab segada tavapäraste taimekaitsevahenditega. Kuna kõiki praktilisi esinevaid mõjusid ei ole võimalik ette näha, tasub taimede pritsimiseks igal juhul katsetada esmalt väiksemate kogustega segu. Leheväetiste või taimekaitsevahendite segude puhul täitke prits 2/3 osas veega ja lisage väetis või vahend eraldi. Viimase komponendina lisage VITALoSol® GOLD. Pritselahust tuleb pidevalt segada ja see kohe ära kasutada.

Hoiustamine: Meie tooteid testitakse temperatuuridel -10 °C kuni +45 °C, näidatud temperatuuridel saab neid muretu hoiustada. Külma tõttu tekkinud kristallid lahustuvad uuesti soojades tingimustes. Meie toodete parimaks töötlemiseks soovitame hoiustada neid külmumisvabalt alates +5 °C.

Suletuna säilib kuni: vt „parim enne“ kanistri küljel.

Tootja: Lebosol® Dünger GmbH · Wiesengasse 28 · D-67471 Elmstein
Tel. +49 (0) 63 28-9 84 94-0 · www.lebosol.de · info@lebosol.de

ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA!

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -ooni.
Võib põhjustada allergilisi reaktsioone

Ohujuhised:

H315: põhjustab nahaärritust H411: veeorganismidele mürgine, pikaajalise toimega

Ohutusjuhised:

Ennetamine: P101: Hoidke pakend ja märgistusetikett käepärast, kui vajate arstlikku nõustamist. P264: Pärast kasutamist peske põhjalikult käsi. P391: Mahavalgunud kogused tuleb uuesti kokku koguda. Kõrvaldamine: P501: Mahuti/ sisu tuleb kõrvaldada kohaliku omavalitsuse/ riiklike/ rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt.



Tähelepanu!